

Ἀναλόγιον

Βυζαντινή Μουσική - Κλίμακες

Μέθοδος συγκερασμοῦ κλιμάκων - οἱ διατονικὲς κλίμακες τοῦ Διδύμου, τῆς Ἐπιτροπῆς, τοῦ Χρυσάνθου, καὶ οἱ συγκράσεις τους

τοῦ Δρ. Παναγιώτη Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάζοντας διάφορα θεωρητικά βιβλία, παρατηροῦμε ὅτι ἀναφέρονται οἱ ἀποστάσεις τῶν χορδῶν μεταξύ τους μὲ κλασματικούς λόγους, ἀλλὰ καὶ μὲ ἀκέραια τμήματα/κόμματα (π.χ. 12, 10, 8, κτλ.). Ὅμως, γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον γίνεται ἡ ἀντιστοίχιση ἀπὸ τὰ πρῶτα στὰ δεύτερα (ἢ κοινῶς λεγομένη σύγκραση), δὲν ἔχουμε δεῖ νὰ γίνεται ἐπιστημονικὸς λόγος. Αὐτὸ τὸ κενὸ θὰ προσπαθήσουμε νὰ καλύψουμε σὲ αὐτὸ τὸ ἄρθρο μας.

Νὰ τονίσουμε ὅτι ἡ ἔρευνά μας βασίζεται στὸ γεγονός ὅτι ἡ "ἀληθινὴ" κλίμακα (ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, κλίμακα) εἶναι αὐτὴ ποὺ δίνεται μὲ κλασματικούς λόγους, καὶ ὅτι οἱ κλίμακες μὲ τὰ τμήματα/κόμματα (ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, συγκερασμένες κλίμακες), δὲν εἶναι παρὰ προσεγγίσεις τῆς κλίμακας.

Σὲ αὐτὸ τὸ ἄρθρο, θὰ περιοριστοῦμε μόνο στὴν διατονικὴ κλίμακα, καὶ θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὰ παρακάτω θέματα:

1. Ἡ διατονικὴ κλίμακα τοῦ Διδύμου.
2. Ἡ διατονικὴ κλίμακα τῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ συγκερασμὸς τῆς, καὶ σύγκριση μὲ τὴν διατονικὴ κλίμακα τοῦ Διδύμου, καὶ τὴν διατονικὴ τοῦ Χρυσάνθου.
3. Μέθοδος συγκερασμοῦ τῶν κλιμάκων.
4. Κριτικὴ στὸν συγκερασμὸ τῆς κλίμακας τῆς Ἐπιτροπῆς, καὶ νέες συγκράσεις τῆς κλίμακας τῆς.
5. Συγκερασμοὶ τῆς διατονικῆς κλίμακας τοῦ Διδύμου.
6. Συγκερασμοὶ τῆς διατονικῆς κλίμακας τοῦ Χρυσάνθου.
7. Συμπεράσματα.

1. Ἡ διατονικὴ κλίμακα τοῦ Διδύμου.

Ἡ διατονικὴ κλίμακα ποὺ ἀποδέχονται τὰ περισσότερα θεωρητικά, εἶναι αὐτὴ τοῦ Διδύμου τοῦ Ἀλεξανδρέως, 1ος μ.Χ. αἰ. [Κηπουργός 1985, σ. 87] (ἐπίσης δὲς Δεβρελῆ, σ.

31):

Νη - 9/8 - Πα - 10/9 - Βου - 16/15 - Γα - 9/8 - Δι - 9/8 - Κε - 10/9 - Ζω - 16/15 - Νη',

όπου:

- $9/8 = 3/2 : 4/3$
- $10/9 = 5/4 : 9/8$
- $16/15 = 4/3 : 5/4$.

Για την ιστορία, "ό Πυθαγόρας πειραματιζόμενος ακουστικά στο μονόχορδο, βρήκε τούς λόγους τῶν διαστημάτων τῆς ὀκτάβας (1/2 τοῦ μήκους τῆς χορδῆς), τῆς πέμπτης (2/3), καὶ τῆς τετάρτης (3/4)" [Κηπουργός]. Ἐπίσης, τὸ διάστημα μείζονος τρίτης 5/4, ἀποδίδεται στὸν Δίδυμο τὸν Ἀλεξανδρέα, κατὰ τὸν Κηπουργό.

Για νὰ βροῦμε τὴν συχνότητα ἑνὸς φθόγγου (δεδομένης γιὰ παράδειγμα τῆς συχνότητας τοῦ Νη = φ), ἀπλὰ πολλαπλασιάζουμε τὸ φ μὲ τούς κλασματικούς λόγους ἀπὸ τὸν Νη μέχρι τὸν φθόγγο τοῦ ὁποῖου τὸ μήκος τῆς χορδῆς ζητεῖται, π.χ.

$$\text{συχνότητα Κε} = (\phi) * 9/8 * 10/9 * 16/15 * 9/8 * 9/8 = \phi * 27/16.$$

Για νὰ βροῦμε τὸ μήκος τῆς χορδῆς ἑνὸς φθόγγου (π.χ. γιὰ μήκος χορδῆς Νη = 1), ἀπλὰ πολλαπλασιάζουμε τούς ἀντίστροφους κλασματικούς λόγους ἀπὸ τὸν Νη μέχρι τὸν φθόγγο τοῦ ὁποῖου τὸ μήκος τῆς χορδῆς ζητεῖται, π.χ.

$$\text{μῆκος χορδῆς Κε} = (1) * 8/9 * 9/10 * 15/16 * 8/9 * 8/9 = 16/27.$$

Ἐπίσης τὴν παραπάνω διατονικὴ κλίμακα, ἀναφέρουν καὶ τὰ ἑξῆς θεωρητικὰ βιβλία:

1. Βασίλειος Στεφανίδης (1819) [δὲς Παγκρατίου Βατοπαιδινού, σ. 40-41].
2. Μιχαήλ Α. Χατζηαθανασίου (1948), σσ. 10, 20.
3. Ἀβραὰμ Χ. Εὐθυμιάδης (1997), σσ. 66-67.
4. Σπ. Χ. Ψάχου (1997), σ. 173.
5. Νὰ σημειώσουμε ὅτι ὁ Ἀλυγιζάκης (2003), σ. 152, ἔχει τὸ Νη-Γα:
Νη - 9/8 - Πα - 10/9 - Βου - 16/15 - Γα (ἐξάγεται εὐκόλα ἀπὸ τούς λόγους τῶν παλμικῶν κινήσεων πού δίνει), ἀλλὰ τὸ Δι-Κε τὸ δίνει $5/3 : 3/2 = 10/9$ καὶ τὸ Κε-Ζω' $15/8 : 5/3 = 9/8$. Δὲς ἐπίσης Μισαηλίδου, 1902, σ. 51, πού λέει ὅτι τὸ Δι-Κε=10/9, καὶ Κε-Ζω'=9/8 εἶναι διαστήματα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Μουσικῆς. Ἐπίσης εἶναι ἄτοπο νὰ δίνει τὸ Δι-Κε-Ζω' (σ.152) 12-10 τμήματα, καὶ σὲ κλασματικούς λόγους 10/9-9/8, καθότι $10/9 < 9/8$ καὶ $12 > 10$.
6. Ἐπίσης ὁ Μαυρουδῆς (1981), σ. 147, ἔχει τὸ Νη-Γα:
Νη - 9/8 - Πα - 10/9 - Βου - 16/15 - Γα.

Πάντως νὰ ποῦμε ὅτι τόσα θεωρητικὰ βιβλία ὑπάρχουν, καὶ φαίνεται ὅτι δὲν τολμοῦν

(έν γένει) οί συγγραφείς των νὰ καταπιαστοῦν μὲ τὴν κλίμακα, παρὰ δίνουν τὴν συγκεκριμένη κλίμακα (συνήθως ἀντιγραφή ἐκ τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 1881), γιὰ τὴν ὁποῖαν διερωτῶμαι ποιοὶ ἔχουν ἀκούσει πῶς ἀκούγεται. Τὸ βασικότερο στοιχεῖο τῆς θεωρίας, ἡ κλίμακα (χωρὶς αὐτὴν τί θὰ ψάλλεις;), καὶ ὅμως ὑπάρχει κατὰ τὴν γνώμη μας μεγάλη ἄγνοια περὶ αὐτήν.

2. Ἡ διατονικὴ κλίμακα τῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ συγκερασμὸς τῆς, καὶ σύγκριση μὲ τὴν διατονικὴ κλίμακα τοῦ Διδύμου, καὶ τὴν διατονικὴ τοῦ Χρυσάνθου.

Ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ 1881, ἀναφέρει τοὺς λόγους τῶν διαστημάτων τῆς δικῆς τῆς διατονικῆς (μὴ συγκερασμένης) κλίμακας (σσ. 16, 14, τῆς "Στοιχειώδους διδασκαλίας"), κατὰ τὴν ὁποῖαν "ἀντικείμενον ἐπανειλημμένων δοκιμῶν ἐγένετο τὸ μῆκος τῆς χορδῆς διὰ τὸν φθόγγο Βου, ἡ μέση αὐτοῦ ἀξία εὐρέθη οὕσα 0,810 ἐπὶ χορδῆς ἑνὸς μέτρου":

Νη - 9/8 - Πα - 800/729 - Βου - 27/25 - Γα - 9/8 - Δι - 9/8 - Κε - 800/729 - Ζω - 27/25 - Νη',

ὅπου:

- $9/8 * (80/81)^2 = 800/729$
- $9/8 * 24/25 = 27/25$.

Γιὰ παράδειγμα (ἔστω φ ἡ συχνότητα τοῦ Νη, καὶ τὸ μῆκος τῆς χορδῆς 1),

$$\text{συχνότητα Βου} = (\phi) * 9/8 * 800/729 = \phi * 100/81.$$

$$\text{μῆκος χορδῆς Βου} = (1) * 8/9 * 729/800 = 81/100.$$

Ἐπίσης, στὴν "Στοιχειώδη διδασκαλία..." τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 1881, διαβάζουμε (σ. 22): "[...] ἡ Ἐπιτροπὴ προὔτιμησε τὴν πειραματικὴν μέθοδον πάσης θεωρίας· προέβη δηλαδὴ εἰς τὴν σύγκρασιν κατὰ προσέγγισιν τῶν διαστημάτων τοῦ διαγράμματος, ἐπιβαλλομένην πάντοτε εἰς τὴν κατασκευὴν τῶν ὀργάνων χάριν τῆς εὐχρηστίας, [...]. Καὶ μετὰ πολλὰς δοκιμὰς εὗρεν ὅτι ἡ διαίρεσις τοῦ διαστήματος διαπασῶν εἰς 36 ἀκουστικὰ ἴσα διαστήματα ἐκφέρει τὰ ἡμέτερα ἄσματα μετὰ προσεγγίσεως δυναμένης νὰ εὐχαριστήσῃ τὸν μάλλον μεμψίμοιρον ἱεροψάλτην· ἐκ τῶν 36 τούτων ἴσων ἀκουστικῶν βαθμίδων, ἃς ἀπεκάλεσε τμήματα, ἀποδώσασα ἕξ εἰς τὸν μείζονα, πέντε εἰς τὸν ἐλάσσονα, καὶ τέσσαρα εἰς τὸν ἐλάχιστον κετεσκεύασε τὸ Ψαλτήριον."

Δηλαδὴ τὰ διαστήματα τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν συγκεκριμένη διατονικὴ κλίμακα, εἶναι (σ. 49 τῆς Στοιχειώδους διδασκαλίας):

Νη - 6 - Πα - 5 - Βου - 4 - Γα - 6 - Δι - 6 - Κε - 5 - Ζω - 4 - Νη'.

Ἐπίσης ἀναφέρει ἡ Ἐπιτροπὴ, σ. 23: "Ὑποδεικνύει ἐνταῦθα ἡ Ἐπιτροπὴ ὅτι διαίρεσις

του δια πασῶν εἰς 72 ἴσα ἀκουστικὰ διαστήματα ἤθελεν ἐπιφέρει τελειότεραν μεταξὺ θεωρίας καὶ πράξεως συμφωνίαν" (σημείωσε ὅτι αὐτὸ ποὺ λέει ἡ Ἐπιτροπὴ δὲν εἶναι ἀπαραίτητα σωστό γιὰ κάθε εἶδους κλίμακα).

Δηλ. τώρα τὰ διαστήματα θὰ εἶναι (πολλαπλασίασε ἐπὶ δύο, τὰ διαστήματα τῆς ἀνωτέρω κλίμακας):

Νη - 12 - Πα - 10 - Βου - 8 - Γα - 12 - Δι - 12 - Κε - 10 - Ζω - 8 - Νη'.

Σημειωτέον, ὅτι οἱ δύο προαναφερθεῖσες κλίμακες δίνουν τὶς ἴδιες συχνότητες, καὶ ὅτι τὴν παραπάνω συγκερασμένη κλίμακα χρησιμοποιοῦν τὰ περισσότερα (ἐξ ὧσων γνωρίζουμε) θεωρητικά (μερικὰ δίνουν ἐπιπλέον τῆς συγκερασμένης κλίμακας, καὶ κλίμακα [μὲ λόγους](#)), π.χ. τοῦ Α.Χ. Εὐθυμιάδου, σ. 81, τοῦ Δ.Γ. Παναγιωτόπουλου, σ. 50, κ.ά.

Ὅπως λοιπὸν εἶπε ἡ ἴδια ἡ Ἐπιτροπὴ, "προϋτίμησε τὴν πειραματικὴν μέθοδον πάσης θεωρίας". Καὶ ἐπίσης ἔπραξε τὴν διαίρεση τῆς διαπασῶν σὲ 36 ἴσα τμήματα "οὐχὶ ὀδηγουμένη ὑπὸ τῆς προηγηθείσης θεωρίας, ἀλλ' ὑπὸ τῆς ὀξύτητος τῆς ἀκοῆς τῶν μελῶν αὐτῆς", καὶ "μετὰ πολλὰς δοκιμὰς", καὶ "προέβη εἰς τὴν σύγκρασιν κατὰ προσέγγισιν".

Ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε τὴν παρατήρηση τοῦ ἀρχιμ. Παγκρατίου Βατοπεδινοῦ ἐπὶ τῆ βάσει ὅχι τῆς συγκερασμένης (36/72 κόμματα), ἀλλὰ αὐτῆς τῆς διατονικῆς κλίμακας τῆς Ἐπιτροπῆς (σ. 35): "Ἡ διαίρεσις αὕτη τῆς κλίμακος, ἢ μάλλον ὁ καθορισμὸς τοῦ μήκους τῆς χορδῆς ἐκάστου τόνου τῆς κλίμακος εἶνε μὲν ἀκουστικῶς ἀληθῆς, οὐχὶ ὅμως καὶ ἐπιστημονικῶς ἀκριβής· διότι δὲν ἐξήχθη ἀμέσως ἐκ μαθηματικῶν ὑπολογισμῶν, ἀλλὰ κατηρτίσθη ἐπὶ τῆ βάσει δοκιμῶν. Πᾶν δὲ τὸ ἐπὶ τῆ βάσει δοκιμῶν γινόμενον δὲν δύναται νὰ ἦνε καὶ ἐπιστημονικῶς ἀκριβές, καὶ μάλιστα ἀντικείμενα ἀκοῆς· διότι ἐκεῖνο, ὅπερ ἐγὼ ἀντιλαμβάνομαι καὶ θεωρῶ διὰ τῆς ἀκοῆς μου ὡς ὀρθόν, μία ἄλλη ὀξύτέρα καὶ μάλλον εὐαίσθητος ἀκοὴ δύναται νὰ ἀποδείξῃ λελανθασμένον, καὶ δὲν δύναμαι νὰ ἀναιρέσω τὴν ἀντίληψιν καὶ γνώμην αὐτοῦ, διότι δὲν ἔχω ἐπιστημονικὴν μαθηματικὴν βάσιν, ἐφ' ἧς στηριζόμενος νὰ ἀποδείξω τὸ ἐναντίον".










Ἄς σημειωθεῖ ἐπίσης, ὅτι τότε δὲν εἶχαν ἀναλυτὲς φάσματος καὶ ὑπολογιστὲς γιὰ νὰ καταγράψουν ἀκριβέστατα τὶς κλίμακες ποὺ ἔψαλλε ὁ κάθε ψάλτης· συνεπῶς ἂν ἡ ἴδια δουλειὰ γινόταν τὴν σημερινὴ ἐποχὴ, εἶναι δυνατόν τὰ ἀποτελέσματα νὰ διέφεραν.

Παρακάτω συγκρίνουμε τὴν [διατονικὴ κλίμακα](#) τοῦ Διδύμου, μὲ τὴν κλίμακα τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῆς συγκερασμένης αὐτῆς κλίμακα, καθὼς καὶ μὲ τὴν διατονικὴ τοῦ Χρῦσανθου (μέγα Θεωρητικόν, σ. 28) χρησιμοποιώντας ὡς ἀναφορὰ τὸν Νη,

$$N\eta = C = 440 * 2^{(-9/12)} = 261.6256 \text{ Hz.}$$

[Τὰ ἀρχεῖα ἤχων δίνονται μόνο γιὰ ἐξάσκηση (π.χ. γιὰ ἐπαλήθευση τοῦ ὕψους τοῦ φθόγγου ποὺ διαβάζετε στὴν Παραλλαγή), καὶ ὄχι γιὰ χρησιμοποίηση μέσα στοὺς Ἱερούς Ναούς. Οἱ ἤχοι ἔχουν παραχθεῖ μὲ ὑπολογιστὴ μὲ ὑπέρθωση ἀρμονικῶν.]

Πίνακας 1. Σύγκριση Διατονικῶν Κλιμάκων.

Διατονική Διδύμου		Διατονική Ἐπιτροπῆς 1881		Διατονική Χρῦσανθου		Συγκερασμένη Διατονική Ἐπιτροπῆς 1881	
						Νη-Νη' 	
Νη'	523,2511	Νη'	523,2511	Νη'	523,2511	Νη'	523,2511 
16/15		27/25		88/81		8	
Ζω'	490,5479	Ζω'	484,4918	Ζω'	481,6289	Ζω'	484,4650 
10/9		800/729		12/11		10	
Κε	441,4931	Κε	441,4931	Κε	441,4931	Κε	440,0000 
9/8		9/8		9/8		12	
Δι	392,4383	Δι	392,4383	Δι	392,4383	Δι	391,9954 
9/8		9/8		9/8		12	
Γα	348,8341	Γα	348,8341	Γα	348,8341	Γα	349,2282 
16/15		27/25		88/81		8	
Βου	327,0320	Βου	322,9945	Βου	321,0859	Βου	323,3416 
10/9		800/729		12/11		10	
Πα	294,3288	Πα	294,3288	Πα	294,3288	Πα	293,6648 
9/8		9/8		9/8		12	
Νη	261,6256	Νη	261,6256	Νη	261,6256	Νη	261,6256 

[Σημ. Για σύγκριση και ἄλλων διατονικῶν ἀρχαίων κλιμάκων, ὁ ἐνδιαφερόμενος παραπέμπεται στό: http://music.analogion.net/Klimakes/diatonikh_sugkrish2.html]

Κατ' ἀρχὴν παρατηροῦμε ὅτι ἡ διατονικὴ τοῦ Διδύμου, ἡ διατονικὴ τῆς Ἐπιτροπῆς, καὶ ἡ διατονικὴ τοῦ Χρυσάνθου, διαφέρουν μόνο κατὰ τοὺς φθόγγους Βου καὶ Ζω'.

Ἐπίσης βλέπουμε ὅτι ἡ διατονικὴ τῆς Ἐπιτροπῆς, μὲ τὴν συγκερασμένη αὐτῆς, διαφέρουν περίπου 1-1.5Hz, πὺν κατὰ τὴν γνώμη μας δὲν εἶναι πολὺ (δὲν εἶναι ὅμως καὶ λίγο). Δηλαδή ὁ συγκερασμὸς τῆς κλίμακας τῆς Ἐπιτροπῆς σὲ 12-10-8 κτλ. (λαμβάνοντας ὑπ' ὄψιν ἄθροισμα κομμάτων 72) εἶναι καλός.

Ὅμως, ἡ συγκερασμένη κλίμακα 12-10-8, ἔγινε μὲ βάση τὴν κλίμακα τῆς Ἐπιτροπῆς, καὶ δὲν εἶναι σωστὸ πὺν ἀρκετοὶ θεωρητικοὶ τὴν δίνουν καὶ ὡς συγκερασμένη τῆς διατονικῆς κλίμακας τοῦ Διδύμου, ἀφοῦ βλέπουμε ὅτι διαφέρουν μέχρι καὶ 6Hz. Συνεπῶς ἀπαιτεῖται (ἀκριβέστερος) συγκερασμὸς τῆς διατονικῆς κλίμακας τοῦ Διδύμου.

3. Μέθοδος συγκερασμοῦ τῶν κλιμάκων.

Ἐπειδὴ δὲν ἔχουμε δεῖ στὰ θεωρητικὰ βιβλία κάποια μέθοδο συγκερασμοῦ τῶν

κλιμάκων σε ἀκέραια κόμματα (ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Αλυγιζάκη, σ. 152, ὁ ὁποῖος σκιαγραφεῖ σε λίγες γραμμὲς μιὰ μέθοδο χωρὶς ὅμως λεπτομέρειες), θὰ ἀναλύσουμε σε αὐτὴν τὴν ἐνότητα μιὰ ἐπιστημονικὴ μέθοδο.

Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι ἔχουμε ἓνα $(\zeta+1)$ -χορδο (τὸ ζ εἶναι ἀκέραιος), τοῦ ὁποῖου οἱ ἄκρες χορδές (π.χ. P, A), ἔχουν λόγο συχνοτήτων $m > 1$,

$$A - \lambda(1) - B - \lambda(2) - \Gamma - \lambda(3) - \dots - \lambda(\zeta) - P$$

καὶ τὸ ὁποῖο μᾶς δίνεται μὲ τοὺς λόγους $\lambda(1), \dots, \lambda(\zeta)$, ποὺ περικλείονται στὸ παρακάτω διάγραμμα,

$$\lambda = [\lambda(1), \lambda(2), \dots, \lambda(\zeta)]'$$

Αὐτὸ τὸ $(\zeta+1)$ -χορδο, θέλουμε ἐμεῖς νὰ τὸ συγκεκριάσουμε, δηλ. νὰ τὸ διαιρέσουμε σε N ἴσα ἀκουστικὰ τμήματα, καὶ νὰ πάρουμε $\tau(1), \dots, \tau(\zeta)$,

$$\tau = [\tau(1), \tau(2), \dots, \tau(\zeta)]', \quad \text{ἄθροισμα}[\tau] = N,$$

ἔτσι ὥστε τὸ $(\zeta+1)$ -χορδο νὰ δίνεται κατὰ προσέγγιση ὡς

$$A - \tau(1) - B - \tau(2) - \Gamma - \tau(3) - \dots - \tau(\zeta) - P.$$

Οἱ ἀριθμοὶ τ μπορεῖ νὰ εἶναι ἀκέραιοι, ἀλλὰ καὶ νὰ ἔχουν παραπάνω ἀκρίβεια, π.χ. 0.5, 0.25, κ.ο.κ., ἀνάλογα μὲ τὴν προσέγγιση ποὺ θέλουμε νὰ κάνουμε.

Τὸ πρόβλημα τώρα εἶναι, κατὰ πῶς θὰ προσεγγίσουμε (συγκεκριάσουμε) τὸ $(\zeta+1)$ -χορδο. Ἡ προσέγγιση μπορεῖ νὰ γίνεи, γιὰ εὐκολία, εἴτε ὡς

$$m.^{(\tau/N)} \rightarrow \lambda \quad (\alpha)$$

εἴτε παίρνοντας τοὺς λογάριθμους, π.χ. μὲ βάση r (γιὰ κάποιον r), στὴν ἀνωτέρω σχέση ὡς

$$\log_r[m.^{(\tau/N)}] \rightarrow \log_r[\lambda] \quad (\beta).$$

Γιὰ τὴν προσέγγιση θὰ ἀκολουθήσουμε μεθόδους μοντελοποίησης (modelling of data). Φυσικά, ἂν δὲν περιορίσουμε τὰ τ νὰ εἶναι ἀκέραιοι ἀριθμοί, ἀλλὰ πραγματικοί (τὸ ὁποῖο κατὰ τὴν γνώμη μας δὲν ἔχει μεγάλη "πρακτικὴ" ἀξία, καθότι οἱ πραγματικοὶ ἀριθμοὶ δὲν συγκρατοῦνται εὐκόλα ἀπὸ τὴν μνήμη, ὅπως οἱ ἀκέραιοι), τότε ὁ ὑπολογισμὸς τους βγαίνει αὐτόματα ἀπὸ τὴν παραπάνω σχέση (β) , ἐξισώνοντας τὰ δύο μέρη:

$$\log_r[m.^{(\tau/N)}] = \log_r[\lambda] \Leftrightarrow \tau = N * \log_m[\lambda].$$

I. Ελάχιστα τετράγωνα (least-squares fit)

Σύμφωνα με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων θέλουμε να βρούμε το διάνυσμα τ , ώστε να ελαχιστοποιείται το άθροισμα [Numerical Recipes in C, 2nd ed., σ. 657]:

$$\Phi = \text{άθροισμα} [(\lambda - m \cdot (\tau/N))^2] \quad (\alpha' \text{ μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων})$$

Επίσης θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε (ανάμεσα σε άλλες παραλλαγές) την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, προσεγγίζοντας τον λογάριθμο των λόγων:

$$\Phi = \text{άθροισμα} [(\log[\lambda] - \log[m \cdot (\tau/N)])^2] \quad (\beta' \text{ μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων}).$$

Συνεπώς ψάχνουμε για όλα τα διανύσματα τ (με την βοήθεια H/Y) που να ικανοποιούν τους παραπάνω περιορισμούς, και επιλέγουμε αυτό το διάνυσμα που ελαχιστοποιεί το παραπάνω άθροισμα Φ (ως συνάρτηση του N).

Παράδειγμα (προσέγγιση τής διατονικής κλίμακας)

Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε τα τμήματα τής διατονικής κλίμακας ($m=2$):

$$N\eta - \tau(1) - \text{Πα} - \tau(2) - \text{Βου} - \tau(3) - \text{Γα} - \tau(1) - \text{Δι} - \tau(1) - \text{Κε} - \tau(2) - \text{Ζω} - \tau(3) - N\eta'.$$

Για να μειώσουμε την πολυπλοκότητα του προβλήματος, θέτουμε ότι:

$$\tau(1) \geq \tau(2) \geq \tau(3)$$

έπειδή ξέρουμε ότι το ένα διάστημα είναι μεγαλύτερο του άλλου (την ισότητα την θέλουμε σε περίπτωση που το N είναι μικρό). Ακόμη, έξ όρισμοῦ ἔχουμε (ἀπὸ τὴν παραπάνω διατονική κλίμακα),

$$N = 3\tau(1) + 2\tau(2) + 2\tau(3).$$

Έστω $\lambda = [\lambda(1), \lambda(2), \lambda(3)]'$, το διάνυσμα που αντιστοιχεί στους κλασματικούς λόγους τής κλίμακας· π.χ. για την διατονική κλίμακα του Διδύμου (1ης στήλης του Πίνακα 1): $\lambda(1)=9/8$, $\lambda(2)=10/9$, $\lambda(3)=16/15$. Τότε σύμφωνα με την παραπάνω μεθοδολογία, ψάχνουμε να βρούμε το διάνυσμα τ ώστε να μειώνεται το παρακάτω άθροισμα Φ (α' ἢ β' μεθόδου):

$$\Phi = \text{άθροισμα} [\mathbf{a} \cdot (\lambda - m \cdot (\tau/N))^2] \quad (\alpha' \text{ μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων} - \text{I}\alpha')$$

$$\Phi = \text{άθροισμα} [\mathbf{a} \cdot (\log[\lambda] - \log[m \cdot (\tau/N)])^2] \quad (\beta' \text{ μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων} - \text{I}\beta').$$

όπου το \mathbf{a} χρησιμοποιείται, επειδή ο μείζων τόνος $\tau(1)$ απαντάται 3 φορές, ο ελάσσων τόνος $\tau(2)$ 2 φορές, και το μείζον ήμιτόνιο $\tau(3)$ 2 φορές: $\mathbf{a} = [a(1), a(2), a(3)]' = [3, 2, 2]'$.

II. Άλλες μέθοδοι μοντελοποίησης

Άλλες μέθοδοι μοντελοποίησης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν (Κεφ. 15ο του "Numerical Recipes"), αλλά δεν θα ασχοληθούμε γιατί δεν τὸ κρίνουμε σκόπιμο, ἀλλὰ μάλλον χρονοβόρο.

4. Κριτική στὸν συγκερασμὸ τῆς διατονικῆς κλίμακας τῆς Ἐπιτροπῆς, καὶ νέες συγκράσεις τῆς κλίμακάς της.

Ἄς δοῦμε ὅμως τώρα, τὶς δέκα καλύτερες συγκράσεις τῆς διατονικῆς κλίμακας τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 1881 μὲ τὴν μέθοδο Ια', θέτοντας (δὲς Πίνακα 1, 2η στήλη),

$$\lambda(1)=9/8, \lambda(2)=800/729, \lambda(3)=27/25,$$

καὶ περιορίζοντας τὰ τμήματα τ νὰ εἶναι μόνο ἀκέραιοι ἀριθμοί.

Μὲ τὸν ὄρο καλύτερες συγκράσεις, ἐννοοῦμε ὅτι ψάχνουμε γιὰ τὰ N , γιὰ τὰ ὅποια π.χ. $20 \leq N \leq 100$, καὶ βρῖσκουμε π.χ. τὰ 10 καλύτερα, ἀπὸ τὴν ἀποψη ὅτι ἐλαχιστοποιοῦν τὸ Φ (σημείωσε, ὅτι γιὰ κάθε N ψάχνουμε τὰ τ ποὺ ἐλαχιστοποιοῦν τὸ Φ). Τὰ ἀποτελέσματα δίνονται στὸν Πίνακα 2.

Πίνακας 2. Οἱ δέκα καλύτερες νέες συγκράσεις τῆς διατονικῆς κλίμακας τῆς Ἐπιτροπῆς 1881 (2η στήλη τοῦ Πίνακα 1), ὡς πρὸς τὴν ἐλαχιστοποίηση τοῦ Φ τῆς μεθόδου Ια', μὲ $20 \leq N \leq 100$.

N	Φ	$\tau(1), \tau(2), \tau(3)$
82	3.01373816046678e-006	14, 11, 9
89	6.13021147525972e-006	15, 12, 10
53	9.98848833506265e-006	9, 7, 6
99	1.47231503682198e-005	17, 13, 11
96	3.55652182052939e-005	16, 13, 11
65	3.56168171565722e-005	11, 9, 7
75	4.31753829000899e-005	13, 10, 8
94	4.49260117512112e-005	16, 13, 10
36	4.61674171450643e-005	6, 5, 4
72	4.61674171450643e-005	12, 10, 8

Δυστυχῶς βλέπουμε τὸ $N = 36$ (ἢ 72) ποὺ πρότεινε ἡ Ἐπιτροπή, ὄχι στὶς πρῶτες θέσεις (ἀπὸ ἀποψη ἀκρίβειας συγκερασμοῦ), ἀλλὰ στὴν 9η (βάσει τοῦ $N \leq 100$). Τὴν τρίτη θέση

κατέχει το $N=53$, που αποδίδεται στον Δανό Μερκάτορα (17ος αι.) που το βρήκε σε συγγράματα του Κινέζου Κίνγκ Φάνγκ (2ος π.Χ. αι.), και το οποίο χρησιμοποιεί η τουρκική μουσική [Κηπουργός, σ. 90].

Πάντως βλέπουμε ότι το $N = 36$, δίνει όντως $\tau = [6, 5, 4]'$, και το $N = 72$, δίνει (εύκολα εξάγεται) $\tau = [12, 10, 8]'$, και το ίδιο Φ , με την περίπτωση $N=36$.

Επομένως,

1. η σύγκραση της Έπιτροπής ελαχιστοποιεί το Φ συναρτήσει του $N = 36$ (72), όμως...
2. αν αφήσουμε το N να παίρνει τιμές $20 \leq N \leq 100$, τότε βρίσκουμε ότι το $N=82$ δίνει μεγαλύτερη ακρίβεια συγκερασμού από το $N=36$ (72), αλλά και από το $N=53$.

Μας απασχόλησε το ερώτημα, πώς έφθασε η Έπιτροπή στον αριθμό $N=36$, και όχι σε κάποιον άλλον. Μια πιθανή απάντηση είναι η έξης: παρατήρησε ότι στον Πίνακα 2, πάνω από το $N=36$, δεν υπάρχει N μεγαλύτερο του 50. Οπότε αν υποθέσουμε ότι η Έπιτροπή περιόρισε τα $N \leq 50$ (τότε δεν είχαν H/Y για να κάνουν τους υπολογισμούς σε δευτερόλεπτα, οπότε θα κοιτούσαν να μείνουν σε μικρές τιμές του N), τότε όντως το $N=36$ δίνει τον ακριβέστερο συγκερασμό!

Ας συγκρίνουμε όμως και τις συχνότητες (δες Πίνακα 3), και τα σέντς (δες Πίνακα 4), της διατονικής κλίμακας της Έπιτροπής, της συγκερασμένης κατά την έπιτροπή, και της συγκερασμένης με την μέθοδό μας έχοντας $N=82$.

Πίνακας 3. Σύγκριση ως προς τις συχνότητες, της διατονικής κλίμακας της Έπιτροπής 1881 (2η στήλη, Πίνακας 1), με τις συγκερασμένες κλίμακες του $N = 36$ ($N = 72$ δίνει ίδια, αλλά την αναφέρουμε), και $N = 82$ (που δίνει το ελάχιστο Φ , για $20 \leq N \leq 100$, με την μέθοδο Ια').

Έπιτροπή 1881 με λόγους		Σύγκραση $N = 36$		Σύγκραση $N = 72$		Σύγκραση $N = 82$	
Nη'	523,2511	Nη'	523,2511	Nη'	523,2511	Nη'	523,2511
27/25		4		8		9	
Zω'	484,4918	Zω'	484,4650	Zω'	484,4650	Zω'	484,9202
800/729		5		10		11	
Κε	441,4931	Κε	440,0000	Κε	440,0000	Κε	441,8636
9/8		6		12		14	
Δι	392,4383	Δι	391,9954	Δι	391,9954	Δι	392,5481
9/8		6		12		14	
Γα	348,8341	Γα	349,2282	Γα	349,2282	Γα	348,7366
27/25		4		8		9	
Βου	322,9945	Βου	323,3416	Βου	323,3416	Βου	323,1898
800/729		5		10		11	

Πα	294,3288	Πα	293,6648	Πα	293,6648	Πα	294,4934
9/8		6		12		14	
Νη	261,6256	Νη	261,6256	Νη	261,6256	Νη	261,6256

Έπειδή έξ όρισμοϋ, ή μία όκτάβα έχει 1200 σέντς, τὰ σέντς c με βάση τὰ κόμματα/τμήματα τ (N) δίνονται από τήν σχέση,

$$c = \tau * 1200 / N,$$

όπου τ τὰ τμήματα τῶν συγκερασμένων κλιμάκων. Σε σχέση με τούς λόγους λ , τὰ σέντς c δίνονται από τήν σχέση

$$c = 1200 * \log_2(\lambda).$$

Πίνακας 4. Σύγκριση ως πρὸς τὰ σέντς, τῆς διατονικῆς κλίμακας τῆς Ἐπιτροπῆς 1881 (2η στήλη, Πίνακας 1), με τὶς συγκερασμένες κλίμακες τοῦ N = 36 (N = 72 δίνει ἴδια, ἀλλὰ τὴν ἀναφέρουμε), καὶ N = 82 (πὸν δίνει τὸ ἐλάχιστο Φ, γιὰ 20 ≤ N ≤ 100, με τὴν μέθοδο Ια').

Ἐπιτροπή 1881 με λόγους	Σύγκραση N = 36	Σύγκραση N = 72	Σύγκραση N = 82
Νη'	Νη'	Νη'	Νη'
27/25 133.2376	4 133.3333	8 133.3333	9 131.7073
Ζω'	Ζω'	Ζω'	Ζω'
800/729 160.8974	5 166.6667	10 166.6667	11 160.9756
Κε	Κε	Κε	Κε
9/8 203.9100	6 200	12 200	14 204.8780
Δι	Δι	Δι	Δι
9/8 203.9100	6 200	12 200	14 204.8780
Γα	Γα	Γα	Γα
27/25 133.2376	4 133.3333	8 133.3333	9 131.7073
Βου	Βου	Βου	Βου
800/729 160.8974	5 166.6667	10 166.6667	11 160.9756
Πα	Πα	Πα	Πα
9/8 203.9100	6 200	12 200	14 204.8780
Νη	Νη	Νη	Νη

Παρατηροϋμε, ότι όντως ή διαίρεση τῆς κλίμακας τῆς Ἐπιτροπῆς 1881, σε **82 τμήματα** είναι ἀκριβέστερη αὐτῆς τῆς διαίρεσης τῆς ἴδιας τῆς Ἐπιτροπῆς σε 36 (72).

Ἄς προχωρήσουμε ὅμως λίγο παραπάνω, καὶ ἄς ἐπιτρέψουμε στὰ τ νὰ παίρνουν καὶ τιμὲς $+1/2$. Τότε, γιὰ τὸ χωρισμὸ $N=72$, βρισκουμε ὅτι τὸ Φ ἐλαχιστοποιεῖται καὶ πάλι ἀπὸ τὰ τμήματα 12-10-8 ($\Phi=4.6167e-5$).

Ἄν ὅμως ἐπιτρέψουμε στὰ τ νὰ παίρνουν (ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀκέραιες) καὶ τιμὲς $+1/4$, $+1/2$, $+3/4$, τότε, γιὰ τὸν χωρισμὸ $N=72$, βρισκουμε ὅτι τὸ Φ ἐλαχιστοποιεῖται ἀπὸ τὰ τμήματα ($\Phi=3.5565e-005$),

$$12, 9+3/4, 8+1/4.$$

5. Συγκερασμοὶ τῆς διατονικῆς κλίμακας τοῦ Διδύμου.

Εἶδαμε λοιπὸν, ὅτι ὁ συγκερασμὸς τῆς διατονικῆς κλίμακας τῆς Μουσικῆς ἐπιτροπῆς σὲ 36 τμήματα, εἶναι ἀκριβῆς μόνο ἂν θεωρήσουμε $N \leq 50$, καὶ ἐπίσης δεδομένων τῶν 36 τμημάτων, ἢ ἀντιστοίχησι 6-5-4 (ἢ 12-10-8 στὰ 72 τμήματα) στοὺς μείζονες, ἐλάσσονες τόνους καὶ τὰ μείζονα ἡμιτόνια, εἶναι ἀκριβῆς.

Ὅμως ὅπως εἶδαμε, τὰ περισσότερα θεωρητικὰ ἔχουν ἀπορρίψει τοὺς λόγους τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 1881, καὶ χρησιμοποιοῦν τὴν κλίμακα τοῦ Διδύμου (Πίνακας 1, 1η στήλη) - ἄλλωστε διαφέρουν μόνο στοὺς Βου, Ζω'. Τὸ περίεργο εἶναι, ὅτι ὑπάρχουν θεωρητικοί, πὺ δίνουν τὴν διατονικὴ κλίμακα ὄχι μὲ τοὺς λόγους τῆς Ἐπιτροπῆς, ἀλλὰ μὲ τοὺς λόγους τοῦ Διδύμου, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη χρησιμοποιοῦν τὴν συγκερασμένη κλίμακα τῆς Ἐπιτροπῆς ὡς συγκερασμένη τῆς τοῦ Διδύμου, πράγμα ἄτοπο!

Γιὰ αὐτὸ τὸν λόγο θὰ κοιτάξουμε νὰ ἐφαρμόσουμε τὴν μεθοδολογία μας, πρὸς νέους συγκερασμοὺς τῆς διατονικῆς κλίμακας τοῦ Διδύμου, θέτοντας

$$\lambda(1)=9/8, \lambda(2)=10/9, \lambda(3)=16/15,$$

καὶ περιορίζοντας τὰ τμήματα τ νὰ εἶναι μόνο ἀκέραιοι ἀριθμοί.

Ψάξαμε λοιπὸν γιὰ τὰ N , γιὰ τὰ ὅποια $20 \leq N \leq 100$, καὶ βρήκαμε ὅτι τὰ δέκα καλύτερα (μαζὶ μὲ τὰ ἀντίστοιχα τμήματα τ), ἀπὸ τὴν ἄποψη ὅτι ἐλαχιστοποιοῦν τὸ Φ , εἶναι τὰ ἐξῆς (Πίνακας 5).

Πίνακας 5. Οἱ δέκα καλύτερες νέες συγκράσεις τῆς διατονικῆς κλίμακας τοῦ Διδύμου (1η στήλη Πίνακα 1), ὡς πρὸς τὴν ἐλαχιστοποίηση τοῦ Φ , μὲ $20 \leq N \leq 100$, μὲ τὴν μέθοδο Ια'.

N	Φ	$\tau(1), \tau(2), \tau(3)$
53	3.01081300495614e-006	9, 8, 5
65	5.61596668751314e-006	11, 10, 6

99	1.14338002158524e-005	17, 15, 9
94	1.88922812655824e-005	16, 14, 9
87	2.06461830014252e-005	15, 13, 8
77	2.50150850725453e-005	13, 12, 7
84	3.33312886478380e-005	14, 13, 8
72	3.85821541181480e-005	12, 11, 7
96	4.12319674248088e-005	16, 15, 9
89	4.82716373305650e-005	15, 14, 8

Από το παραπάνω βλέπουμε ότι αν θεωρήσουμε ότι διαιρούμε την διατονική κλίμακα του Διδύμου σε 72 τμήματα, τότε τα τμήματα που ελαχιστοποιούν το Φ δεν είναι τα **12-10-8** (τα οποία ήσαν για την κλίμακα της Επιτροπής του 1881, δες Πίνακα 2), αλλά τα **12-11-7!**

Ας προχωρήσουμε όμως λίγο παραπάνω, όπως και στην προηγούμενη ενότητα, και ας επιτρέψουμε στα τ να παίρνουν και τιμές $+1/4, +1/2, +3/4$ (εκτός από τους άκεραιους αριθμούς), τότε, για τον χωρισμό $N=72$, βρίσκουμε ότι το Φ ελαχιστοποιείται και πάλι από τα τμήματα 12-11-7 ($\Phi=3.8582e-5$).

Αν επιτρέψουμε στα τ να παίρνουν και τιμές $+1/5, +2/5, +3/5, +4/5$, τότε, για τον χωρισμό $N=72$, βρίσκουμε ότι το Φ ελαχιστοποιείται από τα τμήματα ($\Phi=1.6669e-5$)

$$12+2/5, 10+4/5, 6+3/5.$$

Απλώς να αναφέρουμε, ότι πρώτος (κατά τις γνώσεις μας) ο Μισαηλίδης (1902), π.χ. σ 53, 82, αναφέρει την διατονική κλίμακα στα 12-11-7 τμήματα (σύνολο 72) - περισσότερες λεπτομέρειες δεν μπορούμε να δώσουμε, καθότι δεν έχουμε όλο το βιβλίο του, παρά φωτογραφίες που βγάλαμε από το βιβλίο που το βρήκαμε στην Έθνικη Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

Πάντως παρατηρούμε ότι στον συγκερασμό της διατονικής κλίμακας του Διδύμου (Πίνακας 5), το $N=53$ δίνει τον ακριβέστερο συγκερασμό για $N \leq 100$. Αν όμως μεγαλώσουμε το πεδίο του N , και θέσουμε π.χ. $N \leq 300$, τότε τα αποτελέσματα διαφέρουν.

Για παράδειγμα, ψάξαμε για τα N , για τα οποία $20 \leq N \leq 300$, και βρήκαμε ότι τα δέκα καλύτερα, από την άποψη ότι ελαχιστοποιούν το Φ (μέθοδος Ια'), είναι τα έξης (Πίνακας 6).

Πίνακας 6. Οί δέκα καλύτερες νέες συγκράσεις της διατονικής κλίμακας του Διδύμου (1η στήλη Πίνακα 1), ως προς την ελαχιστοποίηση του Φ , με $20 \leq N \leq 300$, με την μέθοδο Ια'.

N	Φ	$\tau(1), \tau(2), \tau(3)$

171	4.35410724480881e-007	29, 26, 16
289	4.37391822918611e-007	49, 44, 27
224	6.50085998228181e-007	38, 34, 21
270	6.80993909312701e-007	46, 41, 25
118	7.01258900472729e-007	20, 18, 11
236	7.01258900472729e-007	40, 36, 22
277	9.04772557709026e-007	47, 42, 26
282	1.32999351759810e-006	48, 43, 26
258	1.54147207969269e-006	44, 39, 24
217	1.59650783083671e-006	37, 33, 20

Παρακάτω (πίνακας 7) θα δούμε και την σύγκριση της διατονικής του Διδύμου (ως προς τις συχνότητες), με τις αντίστοιχες συγκερασμένες χρησιμοποιώντας N=72 (12-11-7), N=53, και N=118. Η σύγκριση με N=72 (12-10-8) υπάρχει ήδη στον Πίνακα 1.

Πίνακας 7. Σύγκριση ως προς τις συχνότητες, της διατονικής κλίμακας του Διδύμου (1η στήλη, Πίνακας 1), με τις συγκερασμένες κλίμακες του N=72 (12-11-7), N = 53, και N=118.

Διατονική Διδύμου με λόγους		Διατονική Διδύμου N=72		Διατονική Διδύμου N=53		Διατονική Διδύμου N=118	
Nη'	523,2511	Nη'	523,2511	Nη'	523,2511	Nη'	523,2511
16/15		7		5		11	
Zω'	490,5479	Zω'	489,1515	Zω'	490,1298	Zω'	490,5102
10/9		11		8		18	
Κε	441,4931	Κε	440,0000	Κε	441,4410	Κε	441,2942
9/8		12		9		20	
Δι	392,4383	Δι	391,9954	Δι	392,4229	Δι	392,3794
9/8		12		9		20	
Γα	348,8341	Γα	349,2282	Γα	348,8478	Γα	348,8865
16/15		7		5		11	
Bου	327,0320	Bου	326,4694	Bου	326,7661	Bου	327,0559
10/9		11		8		18	
Πα	294,3288	Πα	293,6648	Πα	294,3056	Πα	294,2403
9/8		12		9		20	
Nη	261,6256	Nη	261,6256	Nη	261,6256	Nη	261,6256

Από την παραπάνω σύγκριση παρατηρούμε ότι το $N=118$, ή 53 δίνει μεγαλύτερη ακρίβεια από το $N=72$, αλλά ή μεταξύ τους σύγκριση είναι δύσκολη, καθότι ή διαφορά στο Φ είναι μικρή (δες Πίνακες 5, 6).

6. Συγκερασμοί τῆς διατονικῆς κλίμακας τοῦ Χρυσάνθου

Σε αὐτήν τήν παράγραφο, θά ἐφαρμόσουμε καί πάλι τήν μέθοδό μας, αὐτήν τήν φορά γιά τήν διατονική κλίμακα τοῦ Χρυσάνθου (Πίνακας 1, 3η στήλη), θέτοντας

$$\lambda(1)=9/8, \lambda(2)=12/11, \lambda(3)=88/81,$$

καί περιορίζοντας τὰ τμήματα τ νά εἶναι μόνο ἀκέραιοι ἀριθμοί.

Ψάξαμε λοιπόν καί σέ αὐτήν τήν περίπτωση γιά τὰ N , γιά τὰ ὁποῖα $20 \leq N \leq 100$, καί βρήκαμε ὅτι τὰ δέκα καλύτερα (μαζί μέ τὰ ἀντίστοιχα τμήματα τ), ἀπό τήν ἀποψη ὅτι ἐλαχιστοποιοῦν τὸ Φ , εἶναι τὰ ἐξῆς (Πίνακας 8).

Πίνακας 8. Οἱ δέκα καλύτερες νέες συγκράσεις τῆς διατονικῆς κλίμακας τοῦ Χρυσάνθου, ὡς πρὸς τήν ἐλαχιστοποίηση τοῦ Φ , μέ $20 \leq N \leq 100$, μέ τήν μέθοδο Ια'.

N	Φ	$\tau(1), \tau(2), \tau(3)$
94	1.27622336868680e-005	16, 12, 11
65	2.16433874678844e-005	11, 8, 8
41	2.21838733097379e-005	7, 5, 5
82	2.21838733097379e-005	14, 10, 10
89	2.61007853029048e-005	15, 11, 11
99	3.01506404409891e-005	17, 12, 12
77	3.20214146056612e-005	13, 10, 9
87	3.65881080828087e-005	15, 11, 10
58	3.94247689250045e-005	10, 7, 7
70	4.64156885356665e-005	12, 9, 8

Ἄν θέσουμε $N=68$, τότε βρίσκουμε τὸν ἀκόλουθο συγκερασμό (ποὺ ἐλαχιστοποιεῖ τὸ Φ):

$$\tau = [12, 8, 8]', \text{ μέ } \Phi=1.534429226890763e-004,$$

καί ἂν ἀφήσουμε τὰ τμήματα τ νά παίρνουν καί τιμές $+1/3, +2/3$, τότε

$$\tau = [12, 8+1/3, 7+2/3]', \text{ μέ } \Phi=1.414187497358495e-004.$$

Ἐπίσης ἂν θέσουμε $N=72$, βρίσκουμε:

$$\tau = [12, 9, 9]', \text{ με } \Phi=5.306892730564770e-005,$$

καὶ ἂν ἀφήσουμε τὰ τμήματα τ νὰ παίρνουν καὶ τιμὲς $+1/3, +2/3$, τότε

$$\tau = [12, 9+1/3, 8+2/3]', \text{ με } \Phi=3.929571600311490e-005.$$

7. Συμπεράσματα

1. Ὁ συγκερασμὸς τῆς διατονικῆς κλίμακας τῆς Μουσικῆς Ἐπιτροπῆς σὲ 36 τμήματα, εἶναι ἀκριβῆς ἂν θεωρήσουμε ὅτι $N \leq 50$ (μᾶλλον κατόρθωμα γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη!), καὶ δὲν εἶναι ἀκριβῆς ἂν π.χ. θεωρήσουμε $N \leq 100$.
2. Δεδομένης τῆς διαίρεσης τῆς κλίμακας τῆς Μουσικῆς Ἐπιτροπῆς σὲ 36 (72) τμήματα, ὁ συγκερασμὸς 6-5-4 (ἢ 12-10-8) εἶναι ἀκριβῆς (γιὰ τὴν διατονικὴ κλίμακα τῆς Ἐπιτροπῆς).
3. Εἶναι λανθασμένη ἢ χρησιμοποίησις τῆς συγκερασμένης κλίμακας τῆς Μουσικῆς Ἐπιτροπῆς (δηλ. 12-10-8), ὡς συγκερασμένης τῆς διατονικῆς κλίμακας τοῦ Διδύμου (ἢ ὅποια ἔχει διαφορετικούς λόγους ἀπὸ αὐτὴν τῆς Ἐπιτροπῆς). Συνεπῶς τὰ θεωρητικὰ βιβλία ποὺ δίνουν τοὺς λόγους τῆς διατονικῆς κλίμακας τοῦ Διδύμου, καὶ παράλληλα τὰ τμήματα τῆς Μουσικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτοδιαψεύδονται.
4. Ὁ ἀκριβέστερος (σύμφωνα μὲ τὴν μεθοδολογία μας) συγκερασμὸς τῆς διατονικῆς κλίμακας τοῦ Διδύμου γιὰ $N < 300$, εἶναι 29-26-16 μὲ $N=171$. Ἐνδεικτικὰ, γιὰ μικρότερο N , τὸ $N=118$, δηλ. 20-18-11, δίνει ἀκρίβεια καλύτερη ἀπὸ τὸ $N=53$ (9-8-5).
5. Ἄν ὅμως δὲν μᾶς νοιάζει ἢ ἀκρίβεια καὶ ἐπιμένουμε στὴν ἐπιλογή $N=72$ (γιὰ λόγους ψαλτικῶν ...κατεστημένου), τότε τὰ τμήματα εἶναι 12-11-7 γιὰ τὴν διατονικὴ κλίμακα τοῦ Διδύμου (καὶ ὄχι 12-10-8, τὰ ὅποια εἶναι γιὰ τὴν διατονικὴ κλίμακα τῆς Ἐπιτροπῆς).
6. Μεγαλώνοντας τὸ N (τὸν ἀριθμὸ τῶν κομμάτων τῆς συγκερασμένης κλίμακας), δὲν μικραίνει ἀπαραίτητα τὸ Φ , δηλ. δὲν ἔχουμε ἀπαραίτητα καλύτερη προσέγγισις.
7. Τέλος, στὸ παρὸν ἄρθρο, ἀσχοληθήκαμε μὲ μεθόδους συγκερασμοῦ τῶν κλιμάκων (εὐρέσεως τοῦ συνόλου τῶν τμημάτων N , καθὼς καὶ αὐτῶν τῶν τμημάτων τ), καὶ βρήκαμε τοὺς καλύτερους συγκερασμοὺς τῶν διατονικῶν κλιμάκων, σύμφωνα μὲ τὴν μεθοδολογία μας.
8. Ὁ καλύτερος ταυτόχρονος συγκερασμὸς περισσοτέρων τῆς μιᾶς κλιμάκων, μπορεῖ νὰ γίνῃ π.χ. δημιουργῶντας μιὰ "ὑπέρ-κλίμακα" ἀποτελουμένη ἀπὸ τὶς ἐπὶ μέρους κλίμακες (ὅποτε $m = 2 \cdot k$, ὅπου k ὁ ἀριθμὸς τῶν κλιμάκων τῆς "ὑπέρ-κλίμακας"), καὶ ἐφαρμόζοντας τὴν μεθοδολογία μας. Ἀλλὰ αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ θέμα μελλοντικοῦ μας ἄρθρου, ὅπως ἐπίσης καὶ οἱ συγκερασμοὶ ἀρκετῶν ἄλλων ἐπὶ μέρους κλιμάκων (μὴ διατονικῶν).

8. Αναφορές (κατ' αλφάβητον)

1. Αντωνίου Ε. Αλυγιζάκη, Θέματα Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, ἔκδ. Π. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 2003.
2. Αστερίου Κ. Δεβρελῆ, Πηδάλιον Βυζαντινῆς Μουσικῆς - Μέθοδος, Θεσσαλονίκη 1989.
3. Ἀβραάμ Χ. Εὐθυμιάδη, Μαθήματα Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, ἔκδ. Δ', Θεσσαλονίκη 1997.
4. Νίκου Κηπουροῦ, Μερικὲς παρατηρήσεις πάνω στὰ βασικὰ διαστήματα τῆς ἑλληνικῆς καὶ ἀνατολικῆς μουσικῆς, περιοδ. Μουσικολογία, τ. 2, Μάϊος 1985, σσ. 83-93.
5. Περικλῆ Φ. Μαυρουδῆ, Ἡ Τέχνη τῆς Βυζαντινῆς καὶ Δημοτικῆς Μουσικῆς μὲ ἀσκήσεις, Β' ἔκδοση, Καβάλα 1981 [Ἐθν. Βιβλ. Ἑλλάδος, ΚΑΛΛ. 471].
6. Μισαήλ Μισαηλίδου, Νέον Θεωρητικὸν Συντομώτατον ἤτοι περὶ τῆς καθ' ἡμᾶς ἐκκλησιαστικῆς καὶ ἀρχαίας ἑλληνικῆς μουσικῆς, ἐν Ἀθήναις 1902 [Ἐθν. Βιβλ. Ἑλλάδος, Μοτσενίγειον ἱστορικὸν ἀρχεῖον νεοελληνικῆς μουσικῆς].
7. Μουσικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Οἴκ. Πατρ. (1881), Στοιχειώδης διδασκαλία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς - ἐκπονηθεῖσα ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ψαλτηρίου, Κωνσταντινούπολις 1888 (ἀνατύπ. ἔκδ. Κουλτούρα).
8. Ἀρχιμ. Παγκρατίου Βατοπεδινοῦ, Ἡ Μουσικὴ Κλίμαξ, ἤτοι ἐπιστημονικὴ διαίρεσις τῆς μουσικῆς κλίμακος καὶ προσδιορισμὸς τοῦ μήκους τῶν χορδῶν αὐτῆς μετὰ μεγίστης μαθηματικῆς ἀκρίβειας, Κωνσταντινούπολη, 1917.
9. Δ. Γ. Παναγιωτόπουλου, Θεωρία καὶ Πράξις τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, 1997, ἔκδ. "ΣΩΤΗΡ".
10. Μιχαήλ Α. Χατζηαθανασίου, Αἱ Βάσεις τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Κωνσταντινούπολη, 1948.
11. Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων, Θεωρητικὸν Μέγα τῆς Μουσικῆς, Τεργέστη 1832 (ἀνατύπωσις ἔκδ. Κουλτούρα).
12. Σπ. Χ. Ψάχου, Ἡ Θεωρία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὴν Πράξη, ἔκδ. Νεκτ. Παναγόπουλος, 1997, σ. 173.
13. William H. Press, et. al, Numerical Recipes in C - The art of scientific computing, 2nd ed., Cambridge University Press, 1992 (reprinted 1996).

* * *



Αν βρεῖτε κανένα λάθος, ἢ γνωρίζετε ἄλλη σχετική ἐργασία, παρακαλῶ εἰδοποιῆστε με.

α' πρόχειρη διαδικτυακή ἔκδοση: 22/6/2005.

02/04/2005 - 22/06/2005

panayiotis@analogion.net